

148 mm

Листовка: информация за потребителя

Иберогаст®

Iberogast®

Екстракти от  
9 билки  
Extracts of  
9 herbs

перорални капки, разтвор oral drops, solution

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Иберогаст и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иберогаст
3. Как да приемате Иберогаст
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Иберогаст
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Иберогаст и за какво се използва**

Лекарство на растителна основа за стомашно-чревни заболявания.

За лечение на функционални и свързани с мотилитета стомашно-чревни заболявания като синдром на нервния стомах и раздразнено дебело черво, включително смущения, наподобяващи спазми на стомашно-чревния тракт (стомашно-чревни спазми), както и за поддържащо лечение на оплакванията при възпаление на стомашната лигавица (гастрит).

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иберогаст****Не приемайте Иберогаст**

- ако сте алергични към някоя от съставките на това лекарство (изброени в точка 6).

**Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Иберогаст. Този лекарствен продукт съдържа около 0,24 g алкохол в една доза, еквивалентно на 6,2 ml бира или 2,6 ml вино за доза. Вреден за страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмещи

жени, деца и високорискови групи, като пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия. Ако след 7 дни симптомите продължават или състоянието Ви се влоши, трябва да спрете приема на Иберогаст и да потърсите лекарска помощ.

**Деца и юноши**

Поради липса на достатъчен опит, Иберогаст не трябва да се използва при деца на възраст под 3 години. Винаги да се прави консултация с лекар, ако се появи болка в корема при деца на възраст под 6 години.

**Други лекарства и Иберогаст**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Засега не са известни никакви взаимодействия с други лекарства.

**Иберогаст с храна и напитки**

Засега не са известни никакви взаимодействия с храна.

**Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Досегашните данни не са показали неблагоприятно влияние при употребата на лекарството по време на бременност и кърмене. Въпреки това, по време на бременност и кърмене, Иберогаст трябва да се приема само след консултация с лекар.

**Шофиране и работа с машини**

Иберогаст не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Една доза от 20 капки съдържа около 0,24 g алкохол.

**3. Как да приемате Иберогаст**

Винаги приемайте това лекарство точно както

STEIGERWALD

Arzneimittelwerk GmbH  
Havelstraße 5  
64295 Darmstadt

Produktbezeichnung	Material - Nr.	STW - Auftrag
Iberogast	4100BBG	xxxxxxx
TL017354	Version	Code
Datum: 23.11.2016	5.2	1066
		Größe
		148 x 210

е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Ако няма друго предписание, Иберогаст се приема с малко течност преди или по време на хранене по следния начин:

Възрастни и юноши над 13 години

3 пъти дневно по 20 капки

Деца на възраст от 6 до 12 години

3 пъти дневно по 15 капки

Деца на възраст от 3 до 5 години

3 пъти дневно по 10 капки

Няма принципно ограничение на продължителността на приложение. Продължителността на приема се определя от вида, тежестта и протичането на заболяването.

Да се разклати преди употреба!

**Ако сте приели повече от необходимата доза Иберогаст или ако сте пропуснали да приемете Иберогаст**

В случай, че сте приели Иберогаст в големи количества или сте забравили прием, по време на следващия прием продължете според предписанието на лекаря или както е дадено в упътването за дозиране.

Досега няма данни за остра реакция при предозиране.

**4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много рядко може да се появят реакции на свръхчувствителност като обрив, сърбеж, дихателни затруднения.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

**Изпълнителна агенция по лекарствата**ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София  
тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.  
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.**5. Как да съхранявате Иберогаст**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Срокът на годност за опаковки от 20 ml е 18 месеца. Срокът на годност за опаковки от 50 ml и 100 ml е 24 месеца.

Срок на годност след първоначално отваряне на опаковката - 8 седмици. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху лентата и картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Да се съхранява под 25 °C.

**Предупреждение:**

Ако в Иберогаст след престояване се образува утайка, то тя не оказва влияние върху действието на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

**6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация****Какво съдържа Иберогаст**100 ml разтвор съдържа:  
Активни вещества (екстрагент за всички растения: етанол 50 или 30 обемни %):

Iberidis amarae herba recens extractum fluidum

(течен екстракт от стрък Иберис горчив) extr.

solvent Ethanol 50% (v/v) (1 : 1,5 - 2,5) **15,0 ml**

Angelicae radix et rhizoma extractum fluidum

(течен екстракт от корен Пищялка, лечебна) extr.

solvent Ethanol 30% (v/v) (1 : 2,5 - 3,5) **10,0 ml**

Matricariae flos extractum fluidum (течен екстракт

от цвят Лайка) extr. solvent Ethanol 30% (v/v)

(1 : 2 - 4 ) **20,0 ml**

Carvi fructus extractum fluidum (течен екстракт от

плод Ким) extr. solvent Ethanol 30% (v/v)

(1 : 2,5 - 3,5) **10,0 ml**

Silybi mariani fructus extractum fluidum (течен

екстракт от плод Бял трън) extr. solvent Ethanol

30% (v/v) (1 : 2,5 - 3,5) **10,0 ml**

Melissae folii extractum fluidum (течен екстракт от

лист Маточина) extr. solvent Ethanol 30% (v/v)

(1 : 2,5 - 3,5) **10,0 ml**

Menthae piperitae folii extractum fluidum (течен

екстракт от лист лютивя Мента) extr. solvent

Ethanol 30% (v/v) (1 : 2,5 - 3,5) **5,0 ml**

Chelidonii herba extractum fluidum (течен екстракт

от стрък Змийско мляко) extr. solvent Ethanol

30% (v/v) (1 : 2,5 - 3,5) **10,0 ml**

Liquiritiae radix extractum fluidum (течен екстракт

от Сладък корен) extr. solvent Ethanol 30% (v/v)

(1 : 2,5 - 3,5) **10,0 ml**

Съдържа 31 об. % алкохол.

Иберогаст съдържа по-малко от 0,1 хлебни единици на 20 капки. 1 ml разтвор съдържа 20 капки.

**Как изглежда Иберогаст и какво съдържа опаковката**

Перорални капки, разтвор в тъмна стъклена бутилка с апликатор-капкомер и капачка на винт от PE. Оригинална опаковка от 20 ml

Оригинална опаковка от 50 ml

Оригинална опаковка от 100 ml

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

**Притежател на разрешението за употреба и производител****Притежател на разрешението за употреба:**  
Байер България ЕООД,

ул. „Резбарска“ № 5, 1510 София, България

**Производител:**Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH  
Havelstraße 5, 64295 Darmstadt, Германия**Дата на последно преразглеждане на листовката**  
октомври 2016 г.**Bayer**

4100BBG/MMYY/5.2

PMS 349 C

PMS 376 C

PROCESS

BLACK

210 mm